




糖尿病治療者の特徴分析

株式会社PREVENT

お問い合わせ


<https://prevent.co.jp/contact/>

糖尿病治療中の年次人数推移




糖尿病治療中のHbA1c管理良好者割合

管理良好: HbA1cが6.5%未満



糖尿病治療中の新規イベント発生数






イベント病名はレセプトに記載された病名から取得



糖尿病治療中の特徴


赤色:2018年度に糖尿病治療中である〇〇名

青色:2018年度に糖尿病治療中でない△△名




糖尿病治療中の特徴 -薬剤種類-

糖尿病薬をインスリン、α-グルコシダーゼ阻害薬、スルホニル尿素薬、グリニド薬、チアゾリジン薬、ビッグアイド薬、DPP4阻害薬、SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬、配合薬の10種類に分類し集計した



HbA1cの管理状況による薬剤の使用状況


HbA1c検査値不明〇〇人を除く



糖尿病治療中の特徴 -腎機能-

腎機能をeGFRを用いて次のように分類した。

G1（正常）：90以上、G2（軽度低下）：60以上90未満、G3（中等度低下）：30以上60未満、
G4（高度低下）：15以上30未満、G5（末期腎不全）：15未満



高血圧治療薬の有無による腎機能分類

高血圧治療薬の有無不明もしくはeGFR検査値なし：〇〇人

